

5<sup>ème</sup> année n° 12

Première et deuxième édition n° 5

Troisième édition n° 3

Quatrième édition n° 4

18 avril 1957

### AVERTISSEMENT

TAVELURE

Zones I, 2, 3, 4

La protection des organes verts, assurée par le traitement effectué en exécution de l'avertissement du 3 avril, cesse d'être efficace par suite du grossissement des fruits et du développement des feuilles. C'est pourquoi nous recommandons l'exécution d'un traitement qui doit être réalisé avant le 27 avril; en cas de pluie orageuse, ce traitement sera renouvelé sans attendre un nouvel avis.

### INFORMATIONS

CHEIMATOBIE

Zones I, 2, 3, 4

Ces chenilles occasionnent des dégâts sur les abricotiers et les cerisiers. Des pulvérisations ou des poudrages de D.D.T. sont efficaces.

ANTHONOME

Zone 3

Certains pommiers à floraison très tardive peuvent encore être touchés par l'anthonome. Il est recommandé de réaliser une bouillie mixte en ajoutant un insecticide à la bouillie anticryptogamique destinée à prévenir la Tavelure.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé  
des Avertissements Agricoles,

L. L. TROUILLON

-----  
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, 16 rue de la République - Montpellier. Le Gérant : TROUILLON. Autorisation du 6 mars 1956  
Reproduction, adaptation réservées.